



# PANAMIN

AUSTRIA

## FULVIC



## PANAMIN FULVIC

• **Panamin Fulvic** е ново поколение листен и почвен активатор. Утвърденото през годините имуностимулиращо действие на **Panamin Suspension 20** превърна в най-добрия протектор на добивния потенциал. В най-новата му разработка **Panamin Fulvic** е с подсилена функцията от фулвинови и хуминови киселини за по-широкоспектърно действие.

Хумусните киселини се добиват от природната суровина млад леонардит (загнана растителност на над 100 хил. години). Уникалната технология на извличане на хумусните киселини чрез калий позволява по-висока концентрация на фулвиновите киселини спрямо хуминовите. Фулвиновите киселини са подраздел на хуминовите със сходни характеристики, но за разлика от тях фулвиновите са съставени от малки 100 % водоразтворими молекули, което им позволява максимално усвояване през листата. Хумусните киселини допринасят за:

- повишаване имунния отговор на растенията към неблагоприятните климатични условия, като засушаване, преовлажняване и температурни амплитуди. Образува мицеларно покритие върху листата, което допълнително затруднява проникването на гъбните патогени.
- оптимално усвояване на хранителни вещества и транспортирането им от корена към листата
- трансформират недостъпните хранителни вещества в почвата в усвояема за растенията форма, блокират тежките метали
- спомагат за размножаването на почвените микроорганизми, повишават нивото на въглерод, възвръщат почвеното плодородие и абсорбират

**Fulvic®**  
www.panamin.bg

### СЪСТАВ

Калиев фулват	50гр.
Фулвинови киселини	4,29 %
Хуминови киселини	2,86 %
Органична материя	11,2 %
Органичен въглерод	7,87 %
Калциев карбонат (CaCO <sub>3</sub> ) от който Калциев оксид (CaO)	38,11 % 18,48 %
Магнезиев карбонат (MgCO <sub>3</sub> ) от който Магнезиев оксид (MgO)	4,76 % 2,21 %
Силициев диоксид (SiO <sub>2</sub> )	16,8 %

### МИКРОЕЛЕМЕНТИ

Калиев оксид (K <sub>2</sub> O)	0,91 %
Фосфат (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> )	0,01 %
Железен оксид (Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )	0,52 %

### ХАРАКТЕРИСТИКА

Плътност	1,43
pH стойност	9,5
Доза на приложение	200 - 300 мл/дка ( 1 - 3 третириания ) 600 - 1000 мл/дка почвено

### ПРИЛОЖЕНИЕ

Листно	200 - 300 мл/дка
Почвено	600 - 800 мл/дка



# PANAMIN FULVIC



Иновативният органоминерален микс от микронизирани вулканични скали и хумусни киселини позволяват на културите да разкрият максималният си добивен потенциал, въпреки неблагоприятните климатопочвени условия и неутрализират пестицидния стрес. Допринасят за повишени добиви и качествени показатели.

За максимално добри резултати използвайте **Panamin Fulvic** почвено върху растителни остатъци от края на лятото до момента на сеитба. Почвеното приложение не само ще разгради растителните остатъци, а благодарение на подсилена активност на всички микроорганизми ще върне обратно в почвата остатъчните хранителни вещества в тях. Това приложение се препоръчва при намалени норми на торене. **Panamin Fulvic** се прилага листно при 0,5-1% работен разтвор от начало на активна пролетна вегетация и е препоръчителен да се прилага заедно с продуктите за растителна защита. За есенните слети култури се препоръчва третиране на семената и есенно листно приложение след фаза 3-ти лист заедно с инсектицидните мероприятия.

За максимални резултати използвайте комбинациите на **Panatechnology**.

## PANATECHNOLOGY ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

**Panamin Fulvic 100-200 мл./гка + Panator Alga Max 50-100 мл. или с Panator Amino D 100-200 мл./гка; Panator BLOOM 100-150 мл./гка; Panator Amino Zn 100-150 мл./гка.**