

ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА
Преди употреба прочетете внимателно етикета!

ПОУСИС™

Функция на продукта: фунгицид с несистемно действие

Съдържание на активно вещество: съра 800г/л

Вид на формулацията: суспензионен концентрат (СК)

Категория на употреба: непрофесионална

Разрешен за употреба в Република България с Разрешение №: 01789-ПРЗ Издание 3/21.02.2024 г.

ПРЗ Поусис е идентичен на ПРЗ Флосул.

EUN208 Съдържа 2,2',2" – (1,3,5-триазинан-2,4,6-триил)-триетанол. Може да предизвика алергична реакция.

EUN401 За да се избегнат рисковете за човешкото здраве и околната среда, да се спазват инструкциите за употреба.

Препоръки за безопасност

P102: Да се съхранява извън обсега на деца .

P270: Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта

P501: Съдържанието/съдът да се изхвърли в съответствие с националната уредба.

Допълнително етикетироване:

SP 1 - Да не се замърсяват водите с този продукт или с неговата опаковка. (Да не се почиства оборудването, с което се прилага продуктът, близо до повърхностни води./Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми или пътища.)

SPe 3 - Да се осигури нетретирана буферна зона от 20 метра до неземеделски земи за употреба при семкови овощни видове и 10 м за употреба при костилкови овощни видове с цел опазване на нецелевите членестоноги организми, които не са обект на третиране.

Срок за повторно влизане в третираните площи: 6 часа.

УСЛОВИЯ ЗА ПРОДАЖБА:

Всички наши продукти са с високо качество и са подходящи за препоръчаните употреби. Въпреки това не можем да контролираме условията, при които ще се съхраняват, обработват, смесват или използват, нито можем да контролираме климатичните условия, в които ще се използват. Тези различни фактори, споменати по-горе, могат да повлияят на ефикасността на продукта. Следователно, нашата компания и нашите дистрибутори ще отхвърлят всякаква отговорност за качеството на продуктите, които биха могли да бъдат променени поради лоши условия на съхранение, манипулация или прилагане от страна на потребителя.

УСЛОВИЯ ЗА УПОТРЕБА

ВАЖНО: Тази информация е част от етикета на продукта ПОУСИС™. Всички инструкции в този раздел трябва да се прочетат внимателно.

Разрешени употреби

При лозя (винени и десертни сортове) за контрол на брашнеста мана (*Uncinula necator* (*Oidium tuckeri*)) в доза 400 мл продукт/ дка, приложена с 50-100 л/дка количество вода. До 3,2 л продукт/дка за вегетационен период.

Момент на приложение: ВВСН 15-18 (пет листа са отворени-8 листа са отворени).

Максимален брой приложения: 8.

Минимален интервал между приложенията: 7 дни.

Карантинен срок - времето в дни, което се изчаква за прибиране на реколтата след последното третиране с ПРЗ: 5 дни.

При **домати и патладжан (на полето)** за контрол на брашнеста мана (*Leveillula taurica*) в доза 200 мл продукт/ дка, приложена с 40-150 л/дка количество вода. До 1,2 л продукт/дка за вегетационен период.

Момент на приложение: Първи симптоми на болестта. ВВСН 10-89 (пълно разтваряне на котиледоните-пълна зрялост).

Максимален брой приложения: 6.

Минимален интервал между приложенията: 10 дни.

Карантинен срок - времето в дни, което се изчаква за прибиране на реколтата след последното третиране с ПРЗ: 3 дни.

При **рози (на полето)** за контрол на брашнеста мана (*Podosphaera pannosa*) в доза 300 мл продукт/ дка, приложена с 45-150 л/дка количество вода. До 1,5 л продукт/дка за вегетационен период.

Момент на приложение: Първи симптоми на болестта. ВВСН 10-89.

Максимален брой приложения: 5.

Минимален интервал между приложенията: 10 дни.

Карантинен срок - времето в дни, което се изчаква за прибиране на реколтата след последното третиране с ПРЗ: не се изисква.

При **зърнено-житни култури** за контрол на брашнеста мана (*Blumeria graminis*) в доза 1000 мл продукт/ дка, приложена с 15-30 л/дка количество вода. До 2,0 л продукт/дка за вегетационен период.

Момент на приложение: Първи симптоми на болестта ВВСН 10-89 (първи лист на колеоптила-пълна зрелост).

Максимален брой приложения: 2.

Минимален интервал между приложенията: 14 дни.

Карантинен срок - времето в дни, което се изчаква за прибиране на реколтата след последното третиране с ПРЗ: 35 дни.

При **праскови, нектарини и кайсии** за контрол на брашнеста мана (*Sphaerotheca pannosa*) в доза 500 мл продукт/ дка, приложена със 100л/дка количество вода. До 1,5 л продукт/дка за вегетационен период.

Момент на приложение: Първо приложение от ВВСН 69 (край на цъфтеж).

Максимален брой приложения: 3.

Минимален интервал между приложенията: 7 дни.

Карантинен срок - времето в дни, което се изчаква за прибиране на реколтата след последното третиране с ПРЗ: 3 дни.

При **семкови овощни видове** за контрол на брашнеста мана (*Podosphaera leucotricha*) в доза 750 мл продукт/ дка, приложена със 100л/дка количество вода. До 6,75 л продукт/дка за вегетационен период.

Момент на приложение: Първо приложение от ВВСН 60 (отворени първи цветове).

Максимален брой приложения: 9.

Минимален интервал между приложенията: 7 дни.

Карантинен срок - времето в дни, което се изчаква за прибиране на реколтата след последното третиране с ПРЗ: 3 дни.

При **захарно и кърмно цвекло** за контрол на брашнеста мана (*Erysiphe betae*) в доза 750 мл продукт/ дка, приложена с 20-60 л/дка количество вода. До 1,5 л продукт/дка за вегетационен период.

Момент на приложение: Първи симптоми на болестта ВВСН 10-89 (видими първите листа-пълна зрелост).

Максимален брой приложения: 2.

Минимален интервал между приложенията: 15 дни.

Карантинен срок - времето в дни, което се изчаква за прибиране на реколтата след последното третиране с ПРЗ: 3 дни.

При **тиквички (на полето)** за контрол на брашнеста мана (*Sphaerotheca fuliginea syn. Erysiphe cichoracearum*) в доза 750 мл продукт/ дка, приложена с 10 л/дка количество вода. До 2,25 л продукт/дка за вегетационен период.

Момент на приложение: Първи симптоми на болестта ВВСН 10-89 (котиледоните се разтварят напълно-пълна зрялост).

Максимален брой приложения: 3.

Минимален интервал между приложенията: 7 дни.

Карантинен срок - времето в дни, което се изчаква за прибиране на реколтата след последното третиране с ПРЗ: 3 дни.

При **краставици и тиквови култури с ядлива кора (на полето)** за контрол на брашнеста мана (*Sphaerotheca fuliginea syn. Erysiphe cichoracearum*) в доза 750 мл продукт/ дка, приложена с 10 л/дка количество вода. До 4,5 л продукт/дка за вегетационен период.

Момент на приложение: Първи симптоми на болестта ВВСН 10-89 (котиледоните се разтварят напълно-пълна зрялост).

Максимален брой приложения: 6.

Минимален интервал между приложенията: 7 дни.

Карантинен срок - времето в дни, което се изчаква за прибиране на реколтата след последното третиране с ПРЗ: 3 дни.

При **тикви и тиквови култури с неядлива кора (на полето)** за контрол на брашнеста мана (*Sphaerotheca fuliginea syn. Erysiphe cichoracearum*) в доза 500 мл продукт/ дка, приложена с 10 л/дка количество вода. До 4,0 л продукт/дка за вегетационен период.

Момент на приложение: Първи симптоми на болестта ВВСН 10-89 (котиледоните се разтварят напълно-пълна зрялост).

Максимален брой приложения: 8.

Минимален интервал между приложенията: 7 дни.

Карантинен срок - времето в дни, което се изчаква за прибиране на реколтата след последното третиране с ПРЗ: 3 дни.

При **пъпеша (на полето)** за контрол на брашнеста мана (*Sphaerotheca fuliginea syn. Erysiphe cichoracearum*) в доза 750 мл продукт/ дка, приложена с 20-60 л/дка количество вода. До 3,75 л продукт/дка за вегетационен период.

Момент на приложение: Първи симптоми на болестта ВВСН 10-89 (котиледоните се разтварят напълно-пълна зрялост).

Максимален брой приложения: 5.

Минимален интервал между приложенията: 7 дни.

Карантинен срок - времето в дни, което се изчаква за прибиране на реколтата след последното третиране с ПРЗ: 3 дни.

При **сладък и лют пипер (на полето)** за контрол на брашнеста мана (*Leveillula taurica*) в доза 500 мл продукт/ дка, приложена със 100 л/дка количество вода. До 3,0 л продукт/дка за вегетационен период.

Момент на приложение: Първи симптоми на болестта ВВСН 10-89 (пълно разтваряне на котиледоните-пълна зрялост).

Максимален брой приложения: 6.

Минимален интервал между приложенията: 10 дни.

Карантинен срок - времето в дни, което се изчаква за прибиране на реколтата след последното третиране с ПРЗ: 3 дни.

При **грах без шушулки (на полето)** за контрол на брашнеста мана (*Erysiphe pisi*) в доза 750 мл продукт/ дка, приложена със 100 л/дка количество вода.

Момент на приложение: Първи симптоми на болестта ВВСН 10-89 (вижда се двойка обвивни листа-пълна зрялост).

Максимален брой приложения: 1.

Карантинен срок - времето в дни, което се изчаква за прибиране на реколтата след последното третиране с ПРЗ: 3 дни.

При **марули и салатни култури (на полето)** за контрол на брашнеста мана (*Erysiphe cichoracearum* syn. *Golovinomyces cichoracearum*) в доза 750 мл продукт/ дка, приложена със 100 л/дка количество вода. До 3,0 л продукт/дка за вегетационен период.

Момент на приложение: Първи симптоми на болестта ВВСН 10-89 (котиледоните напълно развити-пълно узряване).

Максимален брой приложения: 4.

Минимален интервал между приложенията: 15 дни.

Карантинен срок - времето в дни, което се изчаква за прибиране на реколтата след последното третиране с ПРЗ: 3 дни.

При **ягоди (на полето)** за контрол на брашнеста мана (*Sphaerotheca macularis* syn. *Podosphaera macularis*, *Podosphaera aphanis*) в доза 750 мл продукт/ дка, приложена с 20-60 л/дка количество вода. До 6,0 л продукт/дка за вегетационен период.

Момент на приложение: Първо приложение от ВВСН 60 (първи отворени цветове).

Максимален брой приложения: 8.

Минимален интервал между приложенията: 9 дни.

Карантинен срок - времето в дни, което се изчаква за прибиране на реколтата след последното третиране с ПРЗ: 3 дни.

Техника на приложение за всички употреби: конвенционална наземна техника.

РЕЗЕРВОАРНИ СМЕСИ

Преди да използвате **ПОУСИСТМ**, уверете се, че пръскачката е добре почистена.

Когато **ПОУСИСТМ** се използва в смес, винаги първо добавяйте **ПОУСИСТМ**.

За повече подробности относно приготвянето на смеси, се свържете с вашия доставчик. За всяка смес спазвайте действащите разпоредби и препоръките на ръководствата за добри практики.

При приготвяне на резервоарни смеси се запознайте с процедурите за почистване на оборудването посочено на етикетите на всички продукти включени в сместа и използвайте най-строгата и подходяща процедура.

ПОДГОТОВКА НА СМЕСТТА ЗА ПРЪСКАНЕ:

Напълнете резервоара до 3/4 с вода, започнете разбъркване и добавете необходимото количество **ПОУСИС™**. Продължете да разбърквате, докато добавите необходимото количество вода.

ПОЧИСТВАНЕ НА РЕЗЕРВОАРА НА ПРЪСКАЧКАТА:

За да се избегнат повреда на култури, след като използвате продукта **ПОУСИС™**, почистете правилно оборудването за пръскане, включително отвътре и отвън, като използвате следната процедура: Винаги започвайте с почистване на резервоара и системата за пръскане. Почистете цялото оборудване веднага след употреба. Изплакнете всички вътрешни повърхности на резервоара (включително капака) с вода (с минимум 10% от капацитета на резервоара), като внимавате да отстраните всички натрупвания. Почистете помпата, филтрите, щангата и дюзите отделно след премахване на остатъците. Повторете изплакването и изпразнете.

Листът за безопасност може да бъде получен при поискване от дистрибутора.

Мерки при първа помощ

След вдишване: При вдишване на химикал изведете пострадалия на чист въздух. Дръжте в покой. В случай на кашлица и лек задух направете изкуствено дишане или се обадете на лекар.

След контакт с кожата: Свалете всички замърсени дрехи. Измийте кожата със сапун и вода за поне 15 минути. Потърсете медицинска помощ, ако дразненето се развие или продължи. Измийте дрехите преди повторна употреба.

След контакт с очите: Изплакнете обилно с вода в продължение на поне 15 минути, като от време на време повдигате горните и долните клепачи. Консултирайте се с офталмолог.

След поглъщане: Незабавно изплакнете устата с вода (само ако лицето е в съзнание). Потърсете медицински съвет. Не предизвиквайте повръщане.

Самозащита на оказващия първа помощ: НЕ влизайте в опасната зона и не се опитвайте да спасите, без да сте сложили подходящи лични предпазни средства.

При необходимост се свържете с Многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина „Н.И. Пирогов“

Телефон за спешни случаи: +359 2 9154 233 (денонощен);

Единен европейски номер за спешни повиквания: 112.

ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА:

Случай на приложение с ръчна пръскачка

Смесване/зареждане:

Нитрилни ръкавици, сертифицирани по EN 374-3, защитен костюм от категория III тип 4

Прилагане на продукта - без интензивен контакт с растителността:

Защитен костюм Клас III тип 4 с качулка; защитни ботуши, сертифицирани по EN 13 832-3; нитрилни ръкавици, сертифицирани по EN 374-3

- интензивен контакт с растителност, високи и ниски култури:

Защитен костюм от категория III тип 3/4 с качулка; защитни ботуши, сертифицирани по EN 13 832-3; нитрилни ръкавици, сертифицирани по EN 374-3

Почистване на пръскачката:

Нитрилни ръкавици, сертифицирани по EN 374-3, защитен костюм от категория III, тип 4

Случай на прилагане с помощта на прикачни или навесни пръскачки или пневматични пръскачки или пулверизатори

Смесване/зареждане:

Нитрилни ръкавици сертифицирани по EN 374-3, работен комбинезон нетъкан полиестер 65% / 35% памук с тегло от 230 г / м² с водоотблъскващо покритие, частично ЛПС (блуза или престилка с дълги ръкави) от категория III и тип PB (3), което да се носи над горепосочения комбинезон.

Приложение на продукта – пръскане надолу

При приложение с трактор с кабина:

Работен комбинезон нетъкан полиестер 65% / 35% памук с тегло от 230 г / м² с водоотблъскващо покритие; нитрилни ръкавици, сертифицирани по EN 374-2, за еднократна употреба, в случай на намеса в материала по време на фазата за пръскане (в този случай, ръкавиците трябва да се носят само извън кабината и трябва да бъдат съхранявани след употреба извън кабината)

При приложение с трактор без кабина:

Работен комбинезон нетъкан полиестер 65% / 35% памук с тегло от 230 г / м² с водоотблъскващо покритие; нитрилни ръкавици, сертифицирани по EN 374-2, за еднократна употреба, в случай на намеса по време на фазата за пръскане

Приложение на продукта – пръскане нагоре

При приложение с трактор с кабина:

Работен комбинезон нетъкан полиестер 65% / 35% памук с тегло от 230 г / м² с водоотблъскващо покритие; нитрилни ръкавици сертифицирани по EN 374-2, за еднократна употреба, в случай на намеса в материала по време на фазата за пръскане (в този случай, ръкавиците трябва да се носят само извън кабината и трябва да бъдат съхранявани след употреба извън кабината)

При приложение с трактор без кабина:

Защитен костюм Клас III тип 4 с качулка: нитрилни ръкавици, сертифицирани по EN 374-2, за еднократна употреба, в случай на намеса в материала по време на фазата за пръскане

Почистване на оборудването за пръскане:

Нитрилни ръкавици сертифицирани по EN 374-3, работен комбинезон нетъкан полиестер 65% / 35% памук с тегло от 230 г / м² с водоотблъскващо покритие, частично ЛПС (блуза или престилка с дълги ръкави) от категория III и тип PB (3), което да се носи над горепосочения комбинезон,

Защита на работниците:

Работен комбинезон нетъкан полиестер 65% / 35% памук с тегло от 230 г / м² с водоотблъскващо покритие и, в случай на контакт с третираните култури нитрилни ръкавици, сертифицирани по EN 374-3

Съхранение: Съхранявайте продукта в оригиналния му контейнер. Съхранявайте контейнера плътно затворен на сухо и добре проветриво място, далече от пряка слънчева светлина. Отворените контейнери трябва да бъдат внимателно запечатани и държани изправени, за да се предотврати изтичане. Съхранявайте далеч от несъвместими материали като силни алкали или окислителни като хлорати, нитрати. Смесите, съдържащи сяра, могат да реагират с метали като сребро и мед, което води до обезцветяване на метала.

Безопасно обезвреждане на остатъците от продукта:

След употреба опаковката да се изплакне трикратно ръчно или с устройство с водна струя под налягане. Промивните води да се изсипят в резервоара на пръскачката. Празните опаковки да се направят негодни за употреба и да не се използват повторно за каквито и да било цели. Този материал и опаковката му да се третират като опасен отпадък и да се изхвърлят само на места за събиране на опасни или специални отпадъци. Не изхвърляйте ПРЗ, остатъци от ПРЗ, и отпадъчни промивни води заедно с битовите отпадъци. ПРЗ, остатъци от него или празните опаковки да се предават на лица, притежаващи разрешение по реда на чл.67 от Закона за управление на отпадъците.

Притежател на разрешението:**ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО**

SML France SAS

25, place de la Madeleine 75008 Paris (France)

Дистрибутор:**Словбул Соланум Пловдив ЕООД**

бул. „Руски“ No123, ет.1, 4000 Пловдив, България

Срок на годност: 2 години от датата на производство при препоръчаните условия на съхранение.

Дата на производство:

Партида №

Нето количество:.... L

